



ทะเบียนพรรณไม้

ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

รหัสสมาชิก 7-18240-002

ก. 7-005

การสำรวจครั้งที่ 1/2560



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

จังหวัดสระบุรี

รหัสสมาชิก 7-18240-002

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-18240-002-001/2	รำเพย (ภาคกลาง)	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ทรงพุ่มกลมและโปร่ง แตกกิ่งก้านมาก ทรงพุ่มกลมและโปร่ง แตกกิ่งก้านมาก ทุกส่วนของลำต้นมีน้ำยางสีขาว	พื้นที่ C แปลงเกษตร พื้นที่ G อาคารสำนักงาน
7-18240-002-002/4	หม่อน (ทั่วไป) มอน (อีสาน) ซึ่มเฮียะ (จีน)	<i>Morus alba</i> L.	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบ รูปไข่ หรือรูปไข่กว้าง ขอบเรียบ หรือหยักเว้าเป็นพู ขึ้นกับพันธุ์ ผิวใบสาก คาย ปลายเรียวแหลมยาว ฐานใบกลม หรือรูปหัวใจ หรือค่อนข้างตัด ใบ มีรสจืดเย็น ฝาดและขมเล็กน้อย มีกลิ่นอ่อนๆ	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-003/5	ด้อยดึงเทศ (กรุงเทพ)	<i>Ruellia simplex</i> C.	ACACTHACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยวหน้าใบสีเขียวหลังใบสีม่วง ดอกออกเป็นช่อลำโพง กลีบดอกหยักๆ สีม่วง ผลรียาวสีเขียว เมื่อแก่จะเป็น สีน้ำตาลดำ	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-004	จำปี (ภาคกลาง)	<i>Magnolia alba</i> (DC.) Figlar	MAGNOLIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง ถี่ กิ่งเปราะ หักง่าย	พื้นที่ G อาคารสำนักงาน

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

จังหวัดสระบุรี

รหัสสมาชิก 7-18240-002

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-18240-002-005/3	กระถิน กระถินไทย กระถินบ้าน (ภาคกลาง) ตอเบา สะตอเทศ สะตอเบา (ภาคใต้) ฝักกานถิน (เชียงใหม่)	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit.	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอกออก แบบช่อกระจุกแน่น ฝอยนุ่มมี กลิ่นหอมเล็กน้อย ผล เป็นฝัก ฝักออกเป็นช่อแบน ผล เป็นฝัก ฝักออกเป็นช่อแบน	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-006/2	ขาสกเกี้ยน ขาญี่ปุ่น (ภาคกลาง) ชาญวน ข่อยจีน (กรุงเทพฯ)	<i>Ehretia microphylla</i> Lam.	BORAGINACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมาก มาก เป็นพุ่มแน่นทึบ ใบเดี่ยว ขอบใบหยัก มีความสาก ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ใบหนา ดอกสีขาวออกเป็นช่อแบบ กระจุกตามซอกใบ	พื้นที่ G อาคารสำนักงาน
7-18240-002-007/4	เข้้ม	<i>Ixora cambodiana</i> Pit.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นเดี่ยวแตกกอแผ่สาขา ลำต้นเรียบสีน้ำตาลกิ่งยอด มีสีเขียว ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ สลับกันรอบต้น ออกดอก เป็นช่อตรงส่วนยอด	พื้นที่ G อาคารสำนักงาน
7-18240-002-008/5	ตะไคร้(ภาคกลาง) จะไคร้(ภาคเหนือ) ไคร้(ภาคใต้)	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	POACEAE	ไม้ล้มลุก	เป็นทรงพุ่ม ลำต้นจะห่อหุ้มด้วย กาบใบโดยรอบใบยาวแคบ มีกลิ่นหอม เส้นใบขนานกับก้านใบ	พื้นที่ C แปลงเกษตร

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

จังหวัดสระบุรี

รหัสสมาชิก 7-18240-002

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-18240-002-009	แก้ว แก้วขาว (ภาคกลาง) แก้วขี้ไก่ (ภาคใต้) แก้วพริก (ภาคเหนือ)	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	RUTACEAE	ไม้พุ่ม	เปลือกลำต้นสีขาวปนเทา ลำต้นแตกเป็นสะเก็ดเป็น ร่องตามยาว ใบเป็นมัน เป็นสีเขียวเข้ม ดอกเป็นช่อ ใหญ่ สีขาวกลิ่นหอม	พื้นที่ G อาคารสำนักงาน
7-18240-002-010/1	อีตู (ภาคอีสาน) แมงลัก (ภาคกลาง) ก้อมก้อขาว (ภาคเหนือ)	<i>Ocimum africanum</i> Lour.	LAMIACEAE	ไม้ล้มลุก	โคนลำต้นแข็ง ลำต้นแตกกิ่งก้าน สาขามาก กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยวลักษณะของใบเป็นวงรี ปลายใบแหลมมีสีเขียวอ่อนขนนึ่ม ใบมีกลิ่นหอม	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-011/10	หมักเห็ด(อีสาน) พริกขี้หนู(ภาคกลาง) พริกแต้ พริกแต้หนู(ภาคเหนือ)	<i>Capsicum annum</i> L.	SOLANACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยว กลมรี ออกสลับตรงปลาย ปลายใบแหลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง มีรสชาติเผ็ด	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-012/1	อีตูไทย (อีสาน) กะเพรา กะเพราขน (ภาคกลาง)	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	LAMIACEAE	ไม้ล้มลุก	โคนของลำต้นแข็ง มีขน มีกลิ่นหอม ใบสีเขียวหรือสีแดงมีกลิ่นหอม ดอกเป็นดอกช่อคล้ายรูปฉัตร สีขาว	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-013/2	ถั่วพู (ภาคกลาง)	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.	FABACEAE	ไม้เลื้อย	ลำต้นมีสีเขียวปนม่วง ดอกเป็นช่อ รูปร่างฝักสี่เหลี่ยมมีปีก 4 ปีก มีสีเขียวผิวฝักมีทั้งเรียบและหยาบ	พื้นที่ C แปลงเกษตร

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

จังหวัดสระบุรี

รหัสสมาชิก 7-18240-002

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-18240-002-014/2	อัญชัน (ภาคกลาง) เอื้องชัน (ภาคเหนือ)	<i>Clitoria ternatea</i> L.	FABACEAE	ไม้เลื้อย	มีเรื้อนยอดทรงพุ่มเป็นรูปไข่ ลำต้นเหนือดินตั้งตนเองไม่ได้ ไข่อัดแน่นเกี่ยวพัน เปลือกลำต้นสีเขียว ไม่มียาง ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว สีเขียว มีดอกเดี่ยว ออกดอกตามซอกกิ่ง รูปดอกถั่ว ผลแห้งฝักแบบถั่ว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-015/5	มะเขือเปราะ มะเขือขื่น มะเขือสวย (ภาคกลาง) เขือพา เขือหิน (ภาคใต้) มะเขือคางกบ มะเขือคำ มะเขือแจ้ (ภาคเหนือ) มะเขือเปราะเจ้าพระยา มะเขือเปราะลายคางกบ (ทั่วไป)	<i>Solanum capsicoides</i> All.	SOLANACEAE	ไม้พุ่ม	ใบมีขนาดใหญ่ เรียงตัวแบบสลับ ดอกมีขนาดใหญ่ สีม่วงหรือสีขาว เป็นดอกเดี่ยว ผลมีรูปร่างกลมแบนหรือรูปไข่ อาจมีสีขาว เขียว เหลือง ม่วง ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ผลเมื่อแก่มีสีเหลือง เนื้อในผลสีเขียวเป็นเมือก มีรสขื่น	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-016/2	ฝักตำลึง (ภาคกลาง) ฝักแคบ (ภาคเหนือ)	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt	CUCURBITACEAE	ไม้รอเลื้อย	ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบแผ่เว้าเป็น 5 แฉก โคนใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลมมน ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 3-6 ซม. ดอกสีขาว เป็นดอกเดี่ยวแยกเพศอยู่ต่างต้น ผลเป็นผลสดรูปขอบขนานหรือรูปป้อม ผลแก่สีแดงส้ม เมล็ดแบนรี มีจำนวนมาก	พื้นที่ C แปลงเกษตร

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

จังหวัดสระบุรี

รหัสสมาชิก 7-18240-002

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-18240-002-017/5	มะละกอ (ภาคกลาง) บักหุ้ง หมักหุ้ง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลอกอ (ภาคใต้) มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ)	<i>Carica papaya</i> L.	CARICACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นตั้งตรงมักไม่แตกกิ่ง ไม่มีแก่น ต้นอวบน้ำ มีรอยแผลเป็นของก้านใบที่ หลุดร่วงไป ใบ ใบเรียงสลับรอบต้น บริเวณยอด ใบเดี่ยว รูปฝ่ามือกว้าง โคนใบเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก เว้าเป็นแฉกลึก และจักฟันเลื่อย เป็นท่อ กลวงยาว ดอก ดอกช่อสีขาวนวล มีกลิ่นหอม ออกที่ซอกใบ ผลเป็นผลสด รูปยาวรี ปลายแหลม ผลดิบมีเนื้อสีขาว เขียว ผลสุกมีเนื้อสีแดงส้มเนื้อหนาอ่อน รสหวาน มีเมล็ดมาก รูปไข่สีน้ำตาลดำ ผิวขรุขระ มีถุงเมือกหุ้ม	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-018/2	รัก รักดอก (ภาคกลาง) ปอเถื่อน ป่านเถื่อน (ภาคเหนือ)	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) W.T. Aiton.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นมีเนื้อไม้ แตกกิ่งก้านมากที่โคนต้น เปลือกไม้สีเทาคล้ายซีเด้า ใบไม่มีก้าน หรือมีก้านสั้น รูปรีกว้าง หรือรูปขอบขนาน อวบน้ำ ปลายแหลม โคนใบรูปหัวใจ ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่ม กลีบดอกผิวเกลี้ยง สีขาว สีม่วงแดง หรือสีม่วงปลายแหลม วงประดับมี 5 แฉก	พื้นที่ G อาคารสำนักงาน

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

จังหวัดสระบุรี

รหัสสมาชิก 7-18240-002

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-18240-002-019	ตะลิงปลิง (ภาคกลาง) หลังปลิง (ภาคใต้)	<i>Averhoa bilimbi</i> L.	OXALIDACEAE	ไม้ยืนต้น	ไม้ผลัดใบ ลำต้นสั้นแตกกิ่งก้านสาขามาก หักง่ายเปลือกสีชมพูผิวเรียบใบแบบขนาน เรียงสลับเวียนกันไปเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง หรือสีม่วงปลายแหลม ผลฉ่ำน้ำ สีเหลืองแกมเขียว ผิวบาง เรียบ รสเปรี้ยวจัด	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-020/3	การเวก (ภาคกลาง) กระดังงาเถา (ภาคใต้)	<i>Artabotrys siamesis</i> Miq. C.	ANNONACEAE	ไม้รอเลื้อย	เนื้อแข็งขนาดกลางถึงใหญ่ มีหนามแข็งและยาวตามลำต้น เปลือกต้นสีเทาอมดำ ค่อนข้างเรียบ ดอกดูมีกลิ่นเหม็นเขียว เพราะมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ ยอดอ่อนมีขน	พื้นที่ G อาคารสำนักงาน
7-18240-002-021/3	ชบา (ภาคกลาง) บา (ภาคใต้) ใหม่ ใหม่แดง(ภาคเหนือ)	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	MALVACEAE	ไม้พุ่ม	พรรณไม้เนื้ออ่อน เปลือกนั้นจะเหนียววาว ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียว โดและฐานใบกว้าง ลักษณะรูปใบมน ตรงปลายใบจะแหลมริมใบจะเป็นจักใหญ่คล้ายกับฟันเลื่อย เมื่อเราเด็ดมาขยี้จะมีเมือกเหนียวๆ ดอกจะออกเดี่ยวๆ อยู่ระหว่างใบ และมีกลีบอยู่ 5 กลีบ ดอกมีอยู่หลายสีคือ แดง ขาว และเหลือง ปลายดอกจะมนแต่กลม เกสร ก้านเกสรยาว และจะยื่นออกมาพ้นจากกลางดอก เกสรตัวผู้เป็นสีเหลือง เกาะอยู่หนาแน่น บนท่อเกสร แกสออนเมียนั้นจะอยู่ปลายสุดของก้านดอก	พื้นที่ C แปลงเกษตร

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

จังหวัดสระบุรี

รหัสสมาชิก 7-18240-002

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-18240-002-022/1	มะนาว ส้มมะนาว (ทั่วไป)	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	RUTACEAE	ไม้ยืนต้น	เป็นพุ่มลำต้นสีเทาแกมน้ำตาล มีหนามแหลม บริเวณกิ่งอ่อนและซอกใบ ใบ เป็นใบประกอบชนิดใบย่อยหนึ่งใบ สีเขียวอ่อนรูปไข่ ยาวรี ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเล็กน้อย เนื้อใบมีต่อมน้ำมันกระจาย ก้านใบสั้น ดอก ช่อหรือดอกเดี่ยว สีขาวที่ซอกใบ กลิ่นหอมอ่อนๆ ร่วงง่าย ผล มีลักษณะคล้ายรูปไข่ หรือค่อนข้างกลม มีตุ่มเล็กๆ ที่ปลายผล ผิวผลขรุขระ มีต่อมน้ำมัน สุกจะมีสีเหลือง รสเปรี้ยว มีเมล็ดขนาดเล็ก สีขาว	พื้นที่ C แปลงเกษตร
7-18240-002-023/2	ผักปลัง ผักปลังใหญ่ (ทั่วไป) ผักบั้ง (ภาคเหนือ)	<i>Basella alba</i> L.	BASELLACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นอวบน้ำ เกลี้ยง กลม แตกกิ่งก้านสาขา ลำต้นมีสีเขียว มีใบสีเขียวเข้ม ใบอวบน้ำ มีลักษณะเป็นมันหนานุ่มมีอฉีกขาดง่าย ขยี้จะเป็นเมือกเหนียว	พื้นที่ C แปลงเกษตร